


Micología

AUTOR: LUIS MARIA IRIARTE



Agrocybe aegerita
(Brig.) Singer

ETIMOLOGÍA (origen de las palabras):

Agrocybe, del griego **agros** = campo y **kybe** = cabeza, que significa "Cabeza de campo o prado" y **Aegerita**, del griego **aigerios** y que significa "Chopo" por su preferencia por habitar sobre los troncos de los chopos.

SINÓNIMOS: (Nombres antiguos de esta seta):

Pholiota cylindracea Gillet.

Agrocybe cylindracea Maire

NOMBRES VULGARES:

Castellano: "Seta de chopo".

Euskera: Makal-ziza.

CARACTERES MACROSCÓPICOS (caracteres que se pueden apreciar a simple vista)

Sombrero (parte superior y ensanchada de la seta):

Al principio de subgloboso (que casi es globoso) a hemisférico (similar a una esfera), luego convexo-extendido (que presenta una curvatura algo más aplanada que la hemisférica), con su margen de enrollado (curvado hacia la base del pie) a involuto (enrollado hacia abajo). Su cutícula (membrana o piel que cubre el sombrero de una seta) con la superficie arrugada, seca, glabra (que carece de toda clase de pilosidad, calva) y de color variable según su edad, con coloraciones marrones en los ejemplares

jóvenes y color blanco crema o blanquecino en la madurez. Las dimensiones son igualmente variables, entre 3 y 10 cm y hasta los 14 cm de diámetro.

Himenio (parte fértil de la seta, donde se sitúan los basidios con células estériles entremezcladas "paráfisis y "cistidios"):

Formado por láminas (tabiques que van del borde del sombrero al pie, donde se sitúa el himenio) apretadas (muy juntas), estrechas (de poca altura), adnatas (cuando las láminas llegan hasta el pie y se adhieren a él) sinuosas (que presentan ondulaciones más o menos profundas), con numerosas laminillas (láminas más cortas que nacen en el borde del sombrero pero que nunca llegan al pie) intercaladas, de un color que va de blancuzco a crema y que pasan en su madurez a color tabaco debido a la maduración de las esporas (estructuras reproductoras de las setas), conservando entonces las aristas de las láminas una coloración más pálida.

Pie (parte de la seta que sostiene al sombrero):

De 3 a 15 cm de alto y de 0,3 a 1,5 cm de grueso, esbelto (bien formado), atenuado (de menor diámetro) en su parte baja, curvado, lleno (macizo), y duro, de color blanco o un poco pardo, posee un anillo (resto membranoso del velo parcial rodeando el pie tras abrirse el sombrero) membranoso (que está constituido por membranas o láminas muy finas), carnoso y persistente (que le dura largo tiempo).